

*Заместитель председателя*

Утверждаю  
Комитет ветеринарного  
контроля и надзора МСХ РК



*С. Абилсимов*

« 24 » 09 2019 г.

**Инструкция  
по применению дезинфицирующего средства  
«INTERKOKASK» (ИНТЕРКОКАСК)**

**1. Общие сведения**

1. Торговое наименование препарата: «INTERKOKASK/  
ИНТЕРКОКАСК»

Международное непатентованное наименование действующего вещества: п-хлор-м-крезол.

2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

3. «INTERKOKASK» в 100 г в качестве действующего вещества содержится: 24,9 г п-хлор-м-крезол

4. Препарат «INTERKOKASK» представляет собой жидкость коричневого цвета.

5. Срок годности ветеринарного препарата при соблюдении условий хранения – 3 года со дня производства.

По истечении срока годности «INTERKOKASK» не должен применяться.

6. Ветеринарный препарат «INTERKOKASK» выпускают расфасованным в бутылки (канистры, бочки) из полиэтилена высокой плотности объемами 1 кг, 10 кг и 120 кг.

7. Каждую единицу фасовки маркируют с указанием: торгового наименования ветеринарного препарата; наименования держателя регистрационного удостоверения и производителя ветеринарного препарата; адреса держателя регистрационного удостоверения и производителя; лекарственной формы; количества ветеринарного препарата в упаковке; состава; номера серии; даты производства и даты истечения срока годности; условий хранения; способа применения; условий отпуска; предупредительных надписей; номера регистрационного удостоверения; дозировки и/или активности и/или концентрации активной фармацевтической субстанции.

8. Хранят ветеринарный препарат «INTERKOKASK» в закрытой упаковке производителя в сухом, хорошо вентилируемом помещении, в защищённом от света месте отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре от 5 до 30 °С. Не допускать заморозке.

9. «ИНТЕРКОКАСК» следует хранить в местах не доступных для детей.

10. В случае истечения срока годности неиспользованный ветеринарный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

Запрещается использование тары из-под препарата для бытовых целей.

11. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

## 2. Порядок применения

«INTERKOKASK (ИНТЕРКОКАСК)» – дезинфицирующее средство. Применяется для дезинфекции животноводческих и птицеводческих помещений, оборудования, инвентаря, для наполнения дезковриков. Обладает широким спектром действия.

«ИНТЕРКОКАСК» имеет активную противомикробное действие в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (*E.coli*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus vulgaris*, *Mycobacterium avium* и другие), вирусов, грибы, грибы (дрожжи) (*Candida albicans*, *Aspergillus brasiliensis*, *Aspergillus niger* и другие), эймерий (ооцисты) (*Eimeria spp.*, *Isospora spp.*), криптоспоридий, обладает дезинвазийными свойствами - уничтожает яйца легочных нематод (*Dictiocaulus spp.*), желудочно-кишечных нематод (*Trichostrongilus spp.*, *Nematodirus spp.*, *Haemonchus spp.*, *Ascaris suum*); цестод, проявляет акарицидное действие: уничтожает клещи и яйца клещей (*Dermanyssus gallinae*), споры.

«INTERKOKASK (ИНТЕРКОКАСК)» правомочны применять специалисты с соответствующим образованием.

Перед применением ветеринарного препарата необходимо удалить животных и тщательно очистить дезинфицирующие поверхности. Тщательно вымыть все распылительное/смесительное оборудование водой. Распылить готовый к использованию раствор на сухие поверхности. Обработать пол, стены, потолки, встроенные части и оборудование, используя оборудование высокого давления максимум на 70 бар (в идеале на 21 бар). Тщательно намочить все поверхности используя от 100 до 400 мл готового к употреблению раствора на м<sup>2</sup> в зависимости от пористости обрабатываемой поверхности, выдержать время экспозиции, дождаться полного высыхания препарата на поверхностях, после хорошо проветрить животноводческое помещение. После использования необходимо промыть все инструменты, пластмассовые детали водой со щелочным моющим средством.

Заполнение дезковриком осуществляется 3% раствором «ИНТЕРКОКАСК», пополнение раствора можно осуществлять ежедневно или по мере загрязнения.

Для дезинфекции использовать водные растворы препарата.

Дезинфекцию проводить после тщательной механической и санитарной очистки поверхностей объектов обеззараживания.

Дезинфекцию проводить способом орошения с помощью оборудования высокого давления и протирания поверхностей рабочими растворами препарата.

Общую дезинфекцию (бактерии, вирусы, грибы, клещи и другие) проводить путем обработки всего помещения, включая потолок и труднодоступные места.

Дезинвазию помещений (кокцидии, гельминты, криптоспоридии и другие) проводят путем обработки всего оборудования, пола и стен на высоту до двух метров.

Диапазон эффективности	Концентрация	Время экспозиции
Гельминты и их яйца	2 %	2 часа
Ооцисты кокцидий	4 %	2 часа
Бактерии	1 %	30 минут
Грибы (дрожжи)	2%	30 минут
Грибы	3%	30 минут
Микобактерии	1%	60 минут
Споры клостридий	4%	60 минут
Вирусы	4%	30 минут
Криптоспоридии	2%	2 часа
Клещи и яйца клещей	3%	24 часа
Эймерии	3%	2 часа

Норма расхода рабочего раствора препарата составляет 100-400 мл /м<sup>2</sup>, в зависимости от вида обрабатываемой поверхности. Для дезинфекции пола необходимо использовать 3% рабочий раствор «ИНТЕРКОКАСК» один раз в неделю. Обеспечить достаточный уровень вентиляции после экспозиции.

После дезинфекции тщательно промыть оборудования щелочным раствором.

### 3. Меры личной профилактики

При работе с препаратом следует строго соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с ветеринарными препаратами. К работе со средством не допускаются лица моложе 18 лет, беременные и кормящие матери. Дезинфекцию проводят с соблюдением мер по защите органов дыхания, кожи и глаз. Приготовление рабочих растворов проводят в проветриваемом помещении. При появлении признаков раздражения органов дыхания следует прекратить работу со средством, пострадавшего немедленно вывести на свежий воздух. Рот и носоглотку прополоскать водой, обратиться к врачу. При случайном попадании средства в глаза необходимо срочно промыть их проточной водой в течение 10-15 минут и обратиться к врачу. При случайном попадании препарата на кожу, нужно тщательно промыть пораженный участок проточной водой, после этого немедленно смазать кожу смягчающим

кремом. При случайном попадании средства в желудок необходимо немедленно промыть желудок и обратиться к врачу. Во время выполнения работ по дезинфекции запрещается курить, пить, принимать пищу. После окончания работы лицо и руки следует вымыть водой с мылом. При обращении к врачу при себе обязательно иметь инструкцию по применению препарата или этикетку.

**Название и местонахождение владельца регистрационного удостоверения:** Interhygiene GmbH Neufelder Str., 27472 Cuxhaven, Germany

**Название и местонахождение производителя (производителей):**  
Interhygiene GmbH Neufelder Str., 27472 Cuxhaven, Germany