

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора



П.А.ВЛАСОВ
10.04.2017

ИНСТРУКЦИЯ
по применению вакцины Эурикан Primo для профилактики парвовирусного энтерита
собак

(организация-разработчик: «Мериал», 29 авеню Тони Гарнье, 69007, Лион, Франция)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое наименование: Эурикан Primo (Eurican Primo).

Международное непатентованное наименование: Вакцина для профилактики парвовирусного энтерита собак.

2. Лекарственная форма: супензия для инъекций.

Вакцина изготовлена из культуральной жидкости перевиваемой линии клеток CrFK, инфицированной парвовирусом собак (штамм CAG), с добавлением полипептидов, полиглицидов и гидролизата коллагена.

3. Вакцина по внешнему виду представляет собой опалесцирующую жидкость желтого цвета. Срок годности вакцины 36 месяцев с даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортирования. По истечении срока годности вакцина к применению не пригодна.

Вакцина Эурикан Primo расфасована по 1 мл (1 иммунизирующую дозу) в стеклянные флаконы соответствующей вместимости, герметично укупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками.

4. Флаконы с вакциной упакованы в коробки по 10 иммунизирующих доз (1 мл). В каждую коробку с вакциной вложена инструкция по ее применению.

5. Вакцину хранят и транспортируют в сухом темном месте при температуре от 2°C до 8°C. Замораживание вакцины не допускается.

6. Вакцину следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Флаконы с вакциной без этикеток, с истекшим сроком годности, с нарушением целостности и/или герметичности укупорки, с наличием посторонней примеси, выбраковывают и обеззараживают кипячением в течение 10 минут с последующей утилизацией.

Утилизация обеззараженной вакцины не требует соблюдения специальных мер предосторожности.

8. Вакцина Эурикан Primo отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9. Эурикан Primo относится к иммунобиологическим препаратам

10. Вакцина вызывает формирование иммунного ответа у собак к возбудителю парвовирусного энтерита через 14-21 сутки после введения, продолжительностью 12 месяцев.

В одной иммунизирующей дозе вакцины содержится не менее $10^{5.5}$ CCID₅₀ парвовируса собак.

Вакцина безвредна, не оказывает эмбриотоксического и тератогенного действия, безопасна при применении беременным и лактирующим животным; лечебными свойствами не обладает.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

11. Вакцина предназначена для профилактики парвовирусного энтерита собак.
12. Запрещено прививать клинически больных и/или ослабленных животных. За 10 дней до вакцинации необходимо провести дегельминтизацию собаки.
13. Вакцину Эурикан Primo вводят подкожно в область лопатки собакам с 6-недельного возраста двукратно с интервалом 6 недель, в дозе 1 мл независимо от массы и породы. При неблагоприятной эпизоотической ситуации допускается первичная вакцинация с 4-х недельного возраста и дополнительная инъекция через 2-3 недели после первого введения.
Ревакцинацию собак проводят через год, далее – каждые 2 года. При неблагоприятной эпизоотической ситуации рекомендуется ежегодная ревакцинация.
Для ревакцинаций допустимо использование моно- или поливалентной вакцины, содержащей парвовирус: Эурикан DHPPI2-L, Эурикан DHPPI2-LR или Гексадог производства компании «Merial».
- При вакцинации необходимо соблюдать правила асептики и антисептики.
14. Симптомов проявления парвовирусного энтерита собак или других патологических признаков при передозировке вакцины не установлено.
15. Особенностей постvakцинальной реакции при первичной и повторных иммунизациях не установлено.
16. Вакцина безопасна при применении беременным и лактирующим животным.
17. Следует избегать нарушений схемы проведения вакцинации, поскольку это может привести к снижению эффективности иммунопрофилактики парвовирусного энтерита собак. В случае пропуска очередного введения необходимо провести иммунизацию как можно скорее.
18. При применении вакцины в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается. В исключительных случаях возможна анафилактическая реакция. В этом случае проводят симптоматическое лечение.
19. Данные о возможности использования вакцины Эурикан Primo одновременно с другими иммунобиологическими препаратами отсутствуют.
20. Сроки возможного использования продукции животного происхождения после введения вакцины Эурикан Primo не устанавливаются.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

21. При работе с вакциной следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами ветеринарного назначения. По окончании работы вымыть руки теплой водой с мылом.
22. Все лица, участвующие в проведении вакцинации, должны быть одеты в спецодежду и обеспечены индивидуальными средствами защиты. В местах работы должна быть аптечка первой доврачебной помощи.
23. При попадании вакцины на кожу и/или слизистые оболочки их рекомендуется промыть большим количеством водопроводной воды.

При случайном введении препарата человеку, место введения необходимо обработать 70% раствором этилового спирта, обратиться в медицинское учреждение и сообщить об этом врачу.

Наименования и адреса производственных площадок производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения

«Мериал», ру де л'Авиасьон, 69800
Сан Прист, Франция/«Merial», rue de
l'Aviation, 69800 Saint Priest, France;

«Мериал», Шеми де Крузоль, 69210
Лентили, Франция/«Merial», Chemin de
Cruzols, 69210 Lentilly, France

Наименование, адрес организации,
уполномоченной держателем или владельцем
регистрационного удостоверения
лекарственного препарата на принятие
претензий от потребителя/Импортер

ООО «Берингер Ингельхайм»,
Российская Федерация,
125171, Москва, Ленинградское шоссе,
16А, стр.3

Инструкция разработана подразделением ветеринарных препаратов ООО «Берингер Ингельхайм» (г. Москва).

С согласованием настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению
вакцины Эурикан Primo, утвержденная заместителем Руководителя Россельхознадзора 03
декабря 2015 г.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».
Номер Регистрационного удостоверения 250-1-4.14-2902 НПВИ-1.3/013 25