

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора



Н. А. ВЛАСОВ  
03.09.2019

## ИНСТРУКЦИЯ по ветеринарному применению вакцины Ингельвак® HP-1

(Организация-разработчик: «Берингер Ингельхайм Ветмедици ГмБХ»,  
Бингер Штрассе 173, Д-55216 Ингельхайм/Рейн, Германия / «Boehringer Ingelheim  
Vetmedica GmbH», Binger Strasse 173, D-55216 Ingelheim/Rhein, Germany)

Номер регистрационного удостоверения:

### I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Ингельвак® HP-1 (Ingelvac® HP-1).

Международное непатентованное наименование: Вакцина против гемофилёзного полисерозита свиней (болезни Глессера) инактивированная.

2. Лекарственная форма: эмульсия для инъекций.

Вакцина изготовлена из культуры бактерий *Haemophilus parasuis* (штамм Z-1517), инактивированной формалином (0,5% по объему), с добавлением монтанида ISA 206 (45-55% по объему) и изотонического раствора хлорида натрия.

3. По внешнему виду вакцина представляет собой эмульсию белого цвета.

Срок годности вакцины - 36 месяцев при соблюдении условий хранения и транспортирования. После первого вскрытия флакона вакцину необходимо использовать немедленно. По истечении срока годности вакцина к применению не пригодна.

4. Вакцина расфасована по 100 мл (50 доз) в полиэтиленовые флаконы соответствующей вместимости. Флаконы герметично укупорены резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. Флаконы с вакциной упакованы в картонные коробки. В каждую коробку с вакциной вложена инструкция по ее применению.

5. Вакцину хранят при температуре от 2°C до 8°C. Замораживание вакцины не допускается.

6. Вакцину следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Флаконы с вакциной без этикеток, с истекшим сроком годности, с нарушением целостности и/или герметичности укупорки, с измененным цветом и/или консистенцией содержимого, с наличием посторонних примесей, подвергшиеся замораживанию, подлежат выбраковке и обеззараживанию путем кипячения в течение 30 минут или 2% раствором щелочи, или 5% раствором хлорамина (1:1) в течение 30 минут и утилизируют.

Утилизация обеззараженной вакцины не требует соблюдения специальных мер предосторожности.

8. Вакцина Ингельвак® HP-1 отпускается без рецепта ветеринарного врача.

### II. Биологические свойства

9. Вакцина Ингельвак® HP-1 - иммунобиологический лекарственный препарат.

10. Вакцина вызывает формирование иммунного ответа у свиней к гемофилезному полисерозиту (болезни Глессера) через 2-3 недели после однократного введения продолжительностью 6 месяцев.

В одной иммунизирующей дозе вакцины (2 мл) содержится не менее  $1,5 \times 10^9$  бактериальных клеток *Haemophilus parasuis*.

Вакцина безвредна, лечебными свойствами не обладает.

### III. Порядок применения

11. Вакцина предназначена для профилактики гемофилёзного полисерозита свиней (болезни Глессера) в неблагополучных и угрожаемых по данной болезни хозяйствах.

12. Запрещено прививать клинически больных и/или ослабленных животных.

13. При работе с вакциной следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами ветеринарного назначения.

Все лица, участвующие в проведении вакцинации, должны быть в спецодежде (халат, брюки или комбинезон, резиновые сапоги, головной убор, резиновые перчатки) и обеспечены индивидуальными средствами защиты (очки закрытого типа, респираторы). В местах работы должна быть аптечка первой доврачебной помощи.

При попадании вакцины на кожу и/или слизистые оболочки, их рекомендуется промыть большим количеством чистой воды. При случайном введении вакцины человеку место введения необходимо обработать 70% раствором этилового спирта, обратиться в медицинское учреждение и сообщить об этом врачу.

14. Вакцина пригодна для иммунизации свиноматок в любой период воспроизводства, а также в течение супоросности и лактации. Свиноматок прививают однократно не позднее 2-3 недель до опороса с целью формирования колострального иммунитета у потомства.

15. Вакцинации подлежат поросята и маточное поголовье свиней.

Вакцину вводят животным, начиная с трёхнедельного возраста, однократно внутримышечно в область шеи за ухом в дозе 2 мл.

Маточное поголовье ревакцинируют через каждые 6 месяцев, но не позднее 2-3 недель до предполагаемой даты опороса.

Вакцину перед применением выдерживают в течение 3 часов при комнатной температуре (18-25 °C) и взвешивают. Шприцы и иглы стерилизуют кипячением. При вакцинации для каждого животного используют отдельную стерильную иглу. Поверхность кожи на месте введения дезинфицируют 70%-ным этиловым спиртом.

16. При применении вакцины в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается. У отдельных животных возможен отек плотной консистенции в месте инъекции, который исчезает в течение 1-2 дней без медикаментозного вмешательства. При проявлении у животных анафилактических реакций проводят симптоматическое лечение антигистаминными препаратами.

17. Симптомов проявления гемофилезного полисерозита (болезни Глессера) или других патологических признаков при передозировке вакцины не установлено.

18. Запрещается применение вакцины Ингельвак® HP-1 одновременно с другими иммунобиологическими препаратами, а также в течение 14 суток до и после применения других вакцин.

19. Особенностей постvakцинальной реакции при первом и последующих введениях вакцины не установлено.

20. Следует избегать нарушений схемы проведения вакцинации, поскольку это может привести к снижению эффективности иммунопрофилактики гемофилезного полисерозита у свиней (болезни Глессера). В случае пропуска очередного введения вакцины необходимо провести иммунизацию как можно скорее.

21. Продукты убоя от вакцинированных животных реализуют без ограничения через 60 суток после вакцинации. В случае убоя животных раньше указанного срока место введения вакцины иссекают.

Наименования и адреса производственных площадок производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения

«Берингер Ингельхайм Анимал Хэлс США Инк.», 2621 Норт Белт Хайвей, Сент Джозеф, Миссури, США 64506 / «Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc.», 2621 North Belt Highway, Saint Joseph, Missouri, U.S.A. 64506

Наименование, адрес организации,  
уполномоченной держателем или  
владельцем регистрационного  
удостоверения лекарственного препарата  
на принятие претензий от  
потребителя/Импортер

ООО «Берингер Ингельхайм»,  
Российская Федерация,  
125171, Москва, Ленинградское шоссе, 16А,  
стр.3

Инструкция по применению вакцины Ингельвак® НР-1 разработана департаментом  
ветеринарных препаратов ООО «Берингер Ингельхайм» (г. Москва).

С согласованием настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению  
вакцины Ингельвак® НР-1, утвержденная Заместителем Руководителя Россельхознадзора  
29.03.2017 года.