

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

Н.А. ВЛАСОВ

02.05.2017



ИНСТРУКЦИЯ
по применению вакцины Эурикан Герпес против герпесвирусной инфекции собак
инактивированная с растворителем

(Организация-разработчик: «Мериал», 29 авеню Тони Гарнье, 69007, Лион,
Франция)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Эурикан Герпес (Eurican Herpes).

Международное непатентованное наименование лекарственного препарата:
Вакцина против герпесвирусной инфекции собак инактивированная с растворителем.

2. Лекарственная форма: вакцина – лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций; растворитель – эмульсия для инъекций.

Вакцина изготовлена из культуральной суспензии линии клеток почек собаки, инфицированных вирусом герпеса (штамм «F205»), инактивированного этиленимином, с добавлением стабилизатора (0,5 мл), содержащего сахарозу (37,5 мг), сорбитол (20 мг), казеина гидролизат (10 мг) и буферного раствора (до 1 дозы), содержащего натрия хлорид (9 мг), дигидрат алюминиевый фосфат (0,9 мг), воду для инъекций (до 1 мл).

3. По внешнему виду сухой компонент вакцины представляет собой сухую однородную массу белого цвета; жидкий компонент – гомогенная эмульсия белого цвета.

Растворитель представляет собой легкое парафиновое масло.

Срок годности вакцины 24 месяца с даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортирования. По истечении срока годности вакцина и растворитель к применению не пригодны.

4. Вакцину выпускают расфасованной по 1 прививной дозе (1 см³), а растворитель – по 1 мл во флаконы соответствующей вместимости, герметично укупоренными резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками.

Флаконы с компонентами вакцины упакованы в коробки по 1 дозе (1 флакон вакцины и 1 флакон растворителя) или по 10 доз (10 флаконов вакцины и 10 флаконов растворителя). В каждую коробку вкладывают инструкцию по применению.

5. Вакцину хранят и транспортируют в сухом темном месте при температуре от 2°C до 8°C. Замораживание вакцины и растворителя не допускается.

6. Вакцину и растворитель следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Компоненты вакцины во флаконах без маркировки, с нарушением целостности и/или герметичности укупорки, с измененным внешним видом, с наличием посторонних примесей, с истекшим сроком годности, подвергшиеся замораживанию, неиспользованные в течение 30 минут после вскрытия флакона, бракуют, обеззараживают кипячением или 2% раствором щелочи или 5% раствором хлорамина (1:1) в течение 30 минут и утилизируют.

Утилизация обеззараженной вакцины не требует соблюдения специальных мер предосторожности.

8. Вакцина Эурикан Герпес отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Биологические свойства

9. Вакцина Эурикан Герпес - иммунобиологический лекарственный препарат.

10. Вакцина Эурикан Герпес вызывает формирование иммунного ответа к возбудителю вируса герпеса собак для передачи пассивного иммунитета потомству.

Вакцина безвредна, лечебными свойствами не обладает.

III. Порядок применения

11. Вакцина Эурикан Герпес предназначена для профилактики герпесвирусной инфекции у собак.

12. Запрещено вакцинировать клинически больных и/или ослабленных животных. За 10 дней до вакцинации необходимо провести дегельминтизацию собаки.

13. Вакцинации подлежат суки. Вакцину вводят в объеме 1 мл подкожно двукратно по следующей схеме:

Первая инъекция: во время течки или через 7-10 дней после даты вязки.

Вторая инъекция: за 1 - 2 недели до предполагаемой даты щенения.

Ревакцинация: двукратно во время каждой течки или беременности, в соответствии со схемой вакцинации.

Перед применением содержимое флакона с сухим компонентом вакцины растворяют в жидким компоненте (растворителе), тщательно перемешивают до получения однородной суспензии. Восстановленная вакцина представляет собой эмульсию белого цвета. При вакцинации необходимо соблюдать правила асептики и антисептики. Восстановленную вакцину необходимо использовать немедленно. Для вакцинации используют стерильные шприцы и иглы.

14. Симптомов проявления вирусного герпеса или других патологических признаков при передозировке вакцины не установлено.

15. Особеностей постvakцинальной реакции при первичной и повторных иммунизациях не установлено.

16. Вакцина безопасна при применении беременным животным. Данные о вакцинации лактирующих животных отсутствуют.

17. Следует избегать нарушений схемы проведения вакцинации, поскольку это может привести к снижению эффективности иммунопрофилактики вируса герпеса собак.

18. При применении вакцины в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается. На месте инъекции возможно появление припухлости, самопроизвольно исчезающей в течение 1 недели. В редких случаях возможна аллергическая реакция. В этом случае проводят симптоматическое лечение.

19. Данные о возможности одновременного введения вакцины Эурикан Герпес с другими вакцинами отсутствуют. Решение о применении Эурикан Герпес до или после введения других вакцин должно приниматься ветеринарным врачом.

20. Сроки возможного использования продукции животного происхождения после введения вакцины Эурикан Герпес не устанавливаются.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с вакциной следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами ветеринарного назначения.

22. Все лица, участвующие в проведении вакцинации, должны быть в спецодежде (халат, брюки или комбинезон, резиновые сапоги, головной убор, резиновые перчатки) и обеспечены индивидуальными средствами защиты (очки закрытого типа, респираторы). В местах работы должна быть аптечка первой доврачебной помощи.

23. При попадании вакцины на кожу и/или слизистые оболочки, их рекомендуется промыть большим количеством чистой воды. После работы следует принять душ, тщательно вымыть руки с мылом, переодеться. В случае разлива вакцины, зараженный участок пола или почвы заливают 5% раствором хлорамина или едкого натрия.

Наименования и адреса производственных площадок производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения

«Мериал», ру де л'Авиасьон, 69800 Сан Прист, Франция /
«Merial», rue de l'Aviation, 69800 Saint Priest, France;

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя/Импортер

ООО «Берингер Ингельхайм»,
Российская Федерация,
125171, Москва, Ленинградское шоссе,
16А, стр.3

Инструкция по применению вакцины Эурикан Герпес разработана подразделением ветеринарных препаратов ООО «Берингер Ингельхайм» (г. Москва).

С согласованием настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению вакцины Эурикан Герпес, утвержденная Заместителем Руководителя Россельхознадзора 21.01.2016 года.

Номер регистрационного удостоверения 180-1-13.15-2957НПВи-1-13.15/04742